

Zemplínske lekárnické dni
Možnosti dokumentácie farmakoterapeutických problémov lekárenskej praxi
Kazuistika č. 2

Muž, 64 rokov

1. konzultácia

Pacient si prišiel vybrať lieky do tejto lekárne prvýkrát, predtým navštevoval lekára v blízkosti bydliska. Lieky užíva dlhodobo, dávkovanie je mu známe. Lieky predpisuje pacientovi všeobecný (praktický) lekár. Pacient nie je pod stálou kontrolou kardiológa ani internistu.

Diagnózy:

srdcové zlyhávanie

znížená funkcia obličiek (clearance kreatinínu 30 ml/min podľa lek. správy)

Terapia:

DIGOXIN LÉČIVA 0,250 mg (digoxín) tbl

1-0-0 (So, Ne – ex.)

Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA tbl slg 20x0,5 mg

p.p.

Identifikované problémy a príčiny zistené pri 1. konzultácii a zvolené intervencie

1. FTP - týkajúci sa **ACE inhibítora** ako štandardnej liečby SZ – potenciálny problém

P 1 Účinnosť terapie

P 1.2 Účinok farmakoterapie nie je optimálny

Príčina/v:

C 1 Výber lieku

C 1.8 Nie je podaný potrebný synergický/preventívny liek

Intervencia/e:

I 2 Na úrovni pacienta

I 2.1 Konzultácia s pacientom

I 2.3 Odporúčenie návštevy predpisujúceho (všeobecného) lekára – odporučiť pacientovi poradiť sa s lekárom o nasadení ACE inhibítora

2. FTP - týkajúci sa **DIGOXINU**-u 0,250 mg – potenciálny problém

P 2 Nežiaduce účinky lieku

P 2.3 Toxický účinok lieku

Príčina/v:

C 3 Výber dávky

C 3.6 Farmakokinetický problém vyžadujúci úpravu dávky

poznámka: úzke terapeutické rozmedzie digoxínu – kvôli riziku toxicity sa pri renálnej insuficiencii dávka digoxínu znižuje na 1/2 až 1/3

Intervencia/e:

I 2 Na úrovni pacienta

I 2.1 Konzultácia s pacientom

I 2.3 Odporúčenie návštevy predpisujúceho lekára (kardiológa) – odporučiť pacientovi poradiť sa s lekárom o znížení dávky digoxínu.

2. konzultácia po 1 mesiaci od prvej konzultácie

Pacient navštívil kardiológa. Kardiológ predpísal Digoxín s nižšou silou a odporučil dávkovanie 0,125 mg/deň) aj so správou všeobecnému lekárovi. Zároveň nasadil pacientovi liečbu perindopril arginínom v dávke 2,5 mg/deň.

Terapia:

DIGOXIN LÉČIVA 0,125 mg (digoxín) tbl	1-0-0 (So, Ne – ex.)
Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA tbl slg 20x0,5 mg	p.p.
PRESTARIUM A 2,5 mg tbl flm 30x2,5 mg	1-0-0

Hodnotenie výsledkov pri 2. konzultácii

1. FTP - týkajúci sa **ACE-inhibítora** – manifestný problém

P 1.2 Účinok farmakoterapie nie je optimálny

Výsledok intervencie:

O 1.0 Problém úplne vyriešený (poznámka: nasadený perindopril arginín 2,5 mg/deň)

2. FTP - týkajúci sa **DIGOXINU**-u 0,250 mg – potenciálny problém

P 2.3 Toxický účinok lieku

Výsledok intervencie:

O 1.0 Problém úplne vyriešený (poznámka: dávku digoxínu znížil lekár na 0,125 mg a odporučil terapeutické monitorovanie hladín digoxínu)